

IGCSE 化學 0620 Paper 4 風格模擬卷

中四 (IGCSE) 化學 | 時限：60 分鐘 | 總分：100 分 | 共 10 題

第 1 題 原子結構與同位素 (10 分)

細閱資料後回答下列各題。

1. 銅有兩個天然同位素： $^{63}_{29}\text{Cu}$ 的豐度為 69.2%， $^{65}_{29}\text{Cu}$ 的豐度為 30.8%。計算銅的相對原子質量，答案準確至 3 個有效數字。

答案： $63 \times 0.692 + 65 \times 0.308 = 43.596 + 20.020 = 63.616$ ，取 63.6。評分：兩項乘積 2 分、相加並取 3 個有效數字 1 分。

2. 寫出 $^{63}_{29}\text{Cu}$ 原子中的質子數、中子數和電子數。

答案：質子 29；中子 $63 - 29 = 34$ ；電子 29（中性原子電子數等於質子數）。評分：每項 1 分。

3. 銅的電子排布為 2, 8, 18, 1。說明銅屬於第 4 周期、並屬於過渡元素的理由。

答案：有 4 個佔用電子層，故屬第 4 周期；3d 亞層電子參與成鍵（d 區元素），故屬過渡元素。評分：周期 2 分（須提及電子層數）、過渡元素 2 分。

第 2 題 化學鍵與結構 (10 分)

比較不同物質的結構與性質。

4. 氯化鈉的熔點為 801°C ，碘的熔點為 114°C 。解釋兩者熔點相差這麼遠的原因。

答案：NaCl 是離子晶體，離子以強靜電引力排列成立體晶格，熔化須斷裂大量離子鍵，能量需求大；碘是簡單分子物質，分子之間只有弱的范德華力（倫敦色散力），熔化只需克服分子間引力。評分：NaCl 結構與引力 2 分、碘結構與引力 2 分。

5. 鉀與氧形成化合物。寫出電子轉移的過程及化合物的化學式。

答案：鉀 (2, 8, 8, 1) 失去 1 個電子成 K^{+} ；氧 (2, 6) 得到 2 個電子成 O^{2-} ；為保持電中性，2 個 K^{+} 配 1 個 O^{2-} ，化學式 K_2O 。評分：離子 1 分、化學式 2 分。

6. 二氧化碳與二氧化矽同為第 14 族元素的氧化物，但 CO_2 在 -78°C 已昇華， SiO_2 的熔點卻超過 $1,700^{\circ}\text{C}$ 。解釋原因。

答案： CO_2 是簡單分子，分子間只有弱范德華力，容易克服； SiO_2 是巨型共價網狀結構，每個矽原子與 4 個氧原子以共價鍵相連，熔化須斷裂大量強共價鍵。評分： CO_2 1 分、 SiO_2 2 分。

第 3 題 摩爾與氣體體積 (12 分)

相對原子質量：C 12、O 16、Ca 40；室溫常壓摩爾體積 $24\text{ dm}^3\text{ mol}^{-1}$ 。

7. 計算 25.0 g 碳酸鈣 (CaCO_3) 的摩爾數。

答案： $M_r(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100$ ； $n = 25.0 \div 100 = 0.250\text{ mol}$ 。評分： M_r 1 分、除法 1 分、單位 1 分。

8. 碳酸鈣受熱分解成氧化鈣和二氧化碳。寫出平衡方程式，並求 0.250 mol 碳酸鈣完全分解生成的二氧化碳摩爾數。

答案： $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ （已平衡）；莫耳比 1:1，故生成 0.250 mol CO_2 。評分：方程式 2 分、莫耳比 1 分、答案 1 分。

9. 在室溫常壓下，上述二氧化碳佔多少體積 (dm^3)？

答案： $V = n \times 24 = 0.250 \times 24 = 6.00 \text{ dm}^3$ 。評分：公式 2 分、數值 2 分、單位 1 分。

第 4 題 電解計算 (10 分)

以 2.0 A 的電流電解硫酸銅溶液 30 分鐘（法拉第常數 96500 C mol^{-1} ， $\text{Cu} = 63.5$ ）。

10. 計算期內通過的電量（庫倫）。

答案： $t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$ ； $Q = It = 2.0 \times 1800 = 3600 \text{ C}$ 。評分：時間換算 2 分、 $Q = It$ 1 分。

11. 計算通過的電子摩爾數。

答案： $n(e^-) = Q \div F = 3600 \div 96500 = 0.0373 \text{ mol}$ (0.037 mol)。評分：公式 2 分、答案 2 分。

12. 已知陰極反應為 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ ，計算陰極析出銅的質量。

答案： $n(\text{Cu}) = 0.0373 \div 2 = 0.0187 \text{ mol}$ ； $m = 0.0187 \times 63.5 = 1.18 \text{ g}$ 。評分：2:1 電子與銅比值 1 分、質量計算 2 分。

第 5 題 反應速率 (10 分)

把 2.0 g 大理石碎粒放入 50 cm^3 過量稀鹽酸中，收集產生的氣體。

13. 實驗在常溫進行，40 秒內收集到 30 cm^3 氣體。計算這段時間的平均速率 ($\text{cm}^3 \text{ s}^{-1}$)。

答案： $30 \div 40 = 0.75 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ 。評分：式 2 分、答案及單位 1 分。

14. 若改用同質量的大理石粉末，其他條件相同。速率會怎樣改變？解釋原因。

答案：速率加快；粉末的表面積比碎粒大，與酸粒子碰撞的機會增加，碰撞頻率上升。評分：方向 2 分、理由 2 分。

15. 寫出兩種其他可加快此反應的方法（不可答「增大表面積」；答「加催化劑」不給分，因該反應無適用催化劑）。

答案：升高溫度；提高鹽酸濃度。評分：每項 1.5 分，合共 3 分。

第 6 題 中和計算 (8 分)

以氫氧化鈉溶液滴定鹽酸： $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 。

16. 25.0 cm^3 的 0.100 mol dm^{-3} 氫氧化鈉溶液，需要多少摩爾 HCl 才完全中和？

答案： $n(\text{NaOH}) = 0.100 \times 0.0250 = 0.00250 \text{ mol}$ ；莫耳比 1:1，故需 0.00250 mol HCl。評分：NaOH 摩爾數 2 分、莫耳比 2 分。

17. 若所用鹽酸的濃度為 0.125 mol dm^{-3} ，需要多少 cm^3 ？

答案： $V = n \div c = 0.00250 \div 0.125 = 0.0200 \text{ dm}^3 = 20.0 \text{ cm}^3$ 。評分：計算 3 分、 dm^3 轉 cm^3 1 分。

第 7 題 氧化與還原 (10 分)

酸性溶液中， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 與鐵(II) 發生反應。

18. 求 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 中鉻的氧化數。

答案：設 Cr 的氧化數為 x ： $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0$ ，即 $2x = 12$ ， $x = +6$ 。評分：方程 2 分、答案 2 分。

19. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被還原成 Cr^{3+} 。寫出鉻氧化數的變化，並指出 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 是氧化劑還是還原劑。

答案：由 $+6$ 降至 $+3$ （每個 Cr 得 3 個電子）； $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 自身被還原，是氧化劑。評分：氧化數變化 2 分、氧化劑 1 分。

20. 寫出鐵(II) 被氧化成鐵(III) 的半反應式。

答案： $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ 。評分：反應物與生成物 2 分、電子 1 分。

第 8 題 有機化學 (12 分)

丙烷 (C_3H_8) 與丙烯 (C_3H_6) 都是三個碳的烴。

21. 寫出丙烷完全燃燒的平衡方程式。

答案： $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。檢查： $\text{C } 3=3$ 、 $\text{H } 8=8$ 、 $\text{O } 10=6+4$ 。評分：係數全對 4 分，錯一處扣 1 分。

22. 0.100 mol 丙烷完全燃燒，生成多少 dm^3 二氧化碳（室溫常壓，摩爾體積 $24 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$ ）？

答案： $n(\text{CO}_2) = 3 \times 0.100 = 0.300 \text{ mol}$ ； $V = 0.300 \times 24 = 7.20 \text{ dm}^3$ 。評分：莫耳比 2 分、體積及單位 2 分。

23. 丙烯能使溴水褪色。寫出生成物的名稱及反應類型。

答案：生成 1,2-二溴丙烷；屬加成反應（雙鍵打開，兩個溴原子分別加到兩個碳上）。評分：產物 2 分、反應類型 2 分。

第 9 題 聚合物 (8 分)

比較加成聚合與縮合聚合。

24. 乙烯聚合生成聚乙烯。寫出重複單元，並指出屬於哪一種聚合。

答案：重複單元為 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ；反應中沒有其他小分子生成，屬加成聚合。評分：重複單元 2 分、聚合類型 2 分。

25. 聚酯（如 PET）由二醇與二羧酸聚合而成。寫出此聚合的名稱，並指出同時生成的小分子。

答案：縮合聚合；每形成一個酯鍵同時脫去一分子水 (H_2O)。評分：名稱 2 分、小分子 2 分。

第 10 題 離子檢驗 (10 分)

用焰色試驗及沉澱反應辨認離子。

26. 鉀鹽的焰色透過鈹玻璃觀察呈淡紫色，鈉鹽的焰色呈黃色。寫出對應的金屬離子。

答案：淡紫色 $\rightarrow \text{K}^+$ ；黃色 $\rightarrow \text{Na}^+$ 。評分： K^+ 2 分、 Na^+ 2 分。

27. 如何檢驗溶液中含硫酸根離子 (SO_4^{2-}) ? 寫出試劑及觀察結果。

答案：先用稀鹽酸酸化（排除碳酸根干擾），再加入氯化鋇溶液，出現白色沉澱 (BaSO_4)。評分：試劑 2 分、觀察 1 分。

28. 如何用一種試劑區分氯化物溶液與碘化物溶液？寫出試劑及兩種觀察結果。

答案：加入硝酸銀溶液：氯化物生成白色沉澱 (AgCl)，碘化物生成黃色沉澱 (AgI)。評分：試劑 2 分、觀察 1 分。