

# CIE A-Level 生物 9700 Paper 2 結構題模擬卷 | 10 題 · 60 分 · 1 小時 15 分

中六至中七 (A-Level AS) 生物 | 時限：75 分鐘 | 總分：60 分 | 共 10 題

## 甲部 (20 分)

結構題：須列出計算步驟，並寫出正確單位。全卷 60 分。

- 科學家以馬鈴薯塊莖的過氧化氫酶測定酶活性：30 秒內收集到  $1.6 \text{ cm}^3$  氧氣。(a) 計算反應速率，以  $\text{cm}^3 \text{ min}^{-1}$  表示。(b) 若速率維持不變，收集  $12 \text{ cm}^3$  氧氣需時多少分鐘？(c) 把溫度由  $30^\circ \text{C}$  升至  $60^\circ \text{C}$  時速率反而急跌，解釋原因；並說明為何反應初段的速率最高。
- 電子顯微照片中一個葉綠體的影像長  $45 \text{ mm}$ ，實際長度為  $150 \mu\text{m}$ 。(a) 計算放大率。(b) 另一照片中一個細胞長  $12 \text{ mm}$ ，放大率為  $\times 400$ ，求實際長度 ( $\mu\text{m}$ )。(c) 列出兩項在電子顯微鏡下才可見、光學顯微鏡看不到的細胞結構，並各寫一句理由。
- 三條同長同重的馬鈴薯條（起始質量  $2.40 \text{ g}$ ）分別放入蒸餾水、 $0.5 \text{ mol dm}^{-3}$  蔗糖液及與細胞液等張的蔗糖液，30 分鐘後質量為  $2.58 \text{ g}$ 、 $2.22 \text{ g}$  及  $2.40 \text{ g}$ 。(a) 計算前兩條的質量變化百分率。(b) 指出哪一個溶液的水勢與馬鈴薯細胞液相同。(c) 解釋第一條質量上升的機制，並說明為何第三條質量不變。

## 乙部 (20 分)

結構題：須列出計算步驟，並寫出正確單位。全卷 60 分。

- 一名學生每分鐘呼吸 12 次，每次潮氣量  $500 \text{ cm}^3$ 。吸入空氣含氧 21%，呼出空氣含氧 16%。(a) 求每分鐘肺通氣量 ( $\text{dm}^3$ )。(b) 求每分鐘吸收的氧氣體積 ( $\text{cm}^3$ )。(c) 解釋肺泡壁的構造如何加快氧的擴散，並指出兩項可提高擴散速率的生理反應。
- 以蒸騰計量度枝條的蒸騰速率：20 分鐘內氣泡移動相當於  $2.4 \text{ cm}^3$  水，葉面積  $60 \text{ cm}^2$ 。(a) 求每分鐘蒸騰量 ( $\text{cm}^3 \text{ min}^{-1}$ )。(b) 求每  $\text{cm}^2$  葉面每分鐘的蒸騰量。(c) 解釋為何同一枝條在強風下的讀數明顯較高。
- 一名運動員靜止時每搏輸出量  $70 \text{ cm}^3$ 、心率  $72 \text{ min}^{-1}$ ；劇烈運動時每搏輸出量  $110 \text{ cm}^3$ 、心率  $150 \text{ min}^{-1}$ 。(a) 求兩個狀態的心輸出量 ( $\text{dm}^3 \text{ min}^{-1}$ )。(b) 求運動時心輸出量是靜止的多少倍。(c) 解釋為何輸出量不能只靠加快心率提升，並說明運動時血管的調節。

## 丙部 (20 分)

結構題：須列出計算步驟，並寫出正確單位。全卷 60 分。

- 兩隻雜合黑色小鼠 ( $Bb$ ) 交配，產生 800 隻後代。(a) 預期黑色與棕色各多少隻？(b) 一隻黑色小鼠與棕色小鼠測交，240 隻後代中 118 隻黑、122 隻棕，指出黑色親本的基因型並解釋。(c) 若兩隻黑色親本交配後代全為黑色，說明牠們的基因型。

8. 一條訊息 RNA 有 300 個鹼基，全部用於翻譯成一條多肽。(a) 這條多肽有多少個胺基酸？(b) 該段編碼的雙鏈 DNA 長多少 nm？（每個鹼基對 0.34 nm）(c) 這條多肽有多少個肽鍵？
9. 酵母在無氧條件下分解 5.4 g 葡萄糖（ $M = 180$ ）。(a) 產生多少 mol 二氧化碳？(b) 在室溫（摩爾體積  $24 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$ ）下佔多少體積？(c) 若完全有氧呼吸，約釋放多少 kJ 能量？（每 mol 葡萄糖 2 880 kJ）
10. 研究人員捕捉 60 隻蝸牛，標記後放回；一週後再捕捉 80 隻，其中 12 隻帶標記。(a) 估算族群大小。(b) 若初級消費者固定 25 000 kJ 能量，按 10 % 傳遞效率，次級消費者與三級消費者各得多少 kJ？