

HKDSE 化學 Paper 2 選修單元模擬卷 | 9 題 · 60 分 · 90 分鐘

中六 (HKDSE) 化學 | 時限：90 分鐘 | 總分：60 分 | 共 9 題

甲部 (20 分)

選修單元題目：須列出計算步驟及答案單位，總分 60 分。

1. (a) 哈柏法以氮氣和氫氣合成氨： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ， ΔH 為負值。解釋為何低溫有利提高平衡產率，但工業上仍採用約 450°C 。(2 分)

(b) 在 2.0 dm^3 的密閉容器中，某溫度下達平衡時含 N_2 0.40 mol 、 H_2 0.60 mol 、 NH_3 0.80 mol 。計算該溫度下的平衡常數 K_c ，並寫出單位。(3 分)

(c) 工業上把生成的氨不斷冷凝移走。說明這做法對產率及反應速率的影響。(2 分)

答案：(a) 正向反應放熱，低溫使平衡右移，產率提高 *1；但低溫反應速率極慢，故提高到約 450°C 以縮短達平衡時間（配合催化劑） *1

(b) $[\text{N}_2] = 0.20$ 、 $[\text{H}_2] = 0.30$ 、 $[\text{NH}_3] = 0.40\text{ mol dm}^{-3}$ *1； $K_c = 0.40^2 \div (0.20 \times 0.30^3)$ *1； $= 29.6\text{ mol}^{-2}\text{ dm}^6$ *1

(c) 移走生成物使平衡右移，產率上升 *1；但濃度下降令正逆反應速率都減慢 *1

2. (a) 乙醇可由葡萄糖發酵製得： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$ 。計算此反應中生成乙醇的原子經濟效益（百分率，取一位小數）。(3 分)

(b) 以 500 kg 葡萄糖發酵，乙醇的產率為 90% ，乙醇密度為 0.789 g cm^{-3} 。計算可得乙醇的體積（以 dm^3 表示，取一位小數）。(3 分)

(c) 寫出發酵法相對乙烯水合法的一個優點。(1 分)

答案：(a) 乙醇總相對分子質量 $= 2 \times 46 = 92$ *1；反應物相對分子質量 $= 180$ *1；原子經濟效益 $= 92 \div 180 \times 100\% = 51.1\%$ *1

(b) 實際反應葡萄糖 $= 500\,000 \times 90\% = 450\,000\text{ g}$ ，即 2500 mol *1；乙醇 $= 5000\text{ mol}$ ，質量 $= 230\,000\text{ g}$ *1；體積 $= 291.5\text{ dm}^3$ *1

(c) 原料可再生（農作物），反應條件溫和、能耗較低 *1

3. (a) 氯鹼工業以電解濃鹽水製造氯氣、氫氣和氫氧化鈉。若電流為 20.0 A ，通電 2.0 小時，計算生成氯氣及氫氧化鈉的質量（各取一位小數； 1 mol 電子 $= 96\,500\text{ C}$ ）。(4 分)

(b) 說明現代工廠以離子交換膜電解槽取代舊式水銀電解槽的兩個原因。(2 分)

答案：(a) 電量 $= 20.0 \times 7\,200 = 144\,000\text{ C}$ *1；電子摩爾數 $= 144\,000 \div 96\,500 = 1.49\text{ mol}$ *1；氯氣 $= 1.49 \div 2 \times 71 = 53.0\text{ g}$ *1；氫氧化鈉 $= 1.49 \times 40 = 59.7\text{ g}$ *1

(b) 水銀有毒，膜電解槽避免汞污染 *1；能耗較低（槽電壓較小）/ 產品較純，不需除汞 *1

乙部 (20 分)

選修單元題目：須列出計算步驟及答案單位，總分 60 分。

4. (a) 尼龍-6,6 由己二酸與己二胺縮合而成。寫出所生成的連結名稱，並說明它屬於哪一類聚合物。(2 分)

(b) 聚苯乙烯由苯乙烯 (C_8H_8 ，相對分子質量 104) 加成聚合而成。若某樣本的相對分子質量為 104 000，計算其聚合度。(3 分)

(c) 解釋為何聚乙烯等加成聚合物在自然環境中難以降解。(2 分)

答案：(a) 酰胺連結 ($-CO-NH-$) *1；縮合聚合物（聚酰胺） *1

(b) 聚合度 = 聚合物相對分子質量 $\div$ 單體相對分子質量 *1； $= 104\,000 \div 104$ *1； $= 1000$ *1

(c) 主鏈由強韌的 C-C 單鍵構成，無極性基團可被水解或受微生物攻擊 *1；分子鏈緊密排列、結晶度高，水及酶難以滲入 *1

5. (a) 已知 Zn^{2+}/Zn 的標準電極電勢為 -0.76 V ， Fe^{2+}/Fe 為 -0.44 V 。解釋為何在鐵閘表面鍍鋅（鍍鋅鐵）能防止鐵生鏽，即使鋅層被刮花。(2 分)

(b) 一塊 $2.0\text{ m} \times 1.0\text{ m}$ 的鍍鋅鋼板，鋅層質量為 80 g m^{-2} ，鋅密度 7.14 g cm^{-3} 。計算鋅層的平均厚度（以 μm 表示，取一位小數）。(3 分)

(c) 鋁比鐵活潑，但鋁製品卻相當耐腐蝕。解釋原因。(2 分)

答案：(a) 鋅的電極電勢較低，作犧牲陽極優先被氧化 *1；刮花後鐵、鋅與電解質形成原電池，電子由鋅流向鐵，鐵成為陰極受保護 *1

(b) 每平方米鋅體積 $= 80 \div 7.14 = 11.2\text{ cm}^3$ *1； $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ *1；厚度 $= 11.2 \div 10\,000 = 1.12 \times 10^{-3}\text{ cm} = 11.2\text{ }\mu\text{m}$ *1

(c) 鋁表面迅速氧化，生成緻密而附著力強的氧化鋁層 *1；該層不透水不透氧，阻止內部金屬繼續被腐蝕 *1

6. (a) 某混凝土按質量比水泥：砂：碎石 $= 1:2:4$ 配製，用水量為水泥質量的 0.5 倍。若要配製 3 500 kg 混凝土，計算水泥、砂、碎石及水的質量（取整數）。(4 分)

(b) 說明為何結構混凝土內常加入鋼筋。(2 分)

答案：(a) 總份數 $= 1 + 2 + 4 + 0.5 = 7.5$ *1；每份 $= 3\,500 \div 7.5 = 466.67\text{ kg}$ *1；水泥 467 kg、砂 933 kg、碎石 1867 kg *1；水 233 kg *1

(b) 混凝土抗壓强度高但抗拉強度低 *1；鋼筋承擔拉力，兩者結合成複合材料，可承受彎曲荷載 *1

丙部 (20 分)

選修單元題目：須列出計算步驟及答案單位，總分 60 分。

7. (a) 把 25.0 cm^3 白醋稀釋至 250.0 cm^3 。取 25.0 cm^3 稀釋液，以 0.100 mol dm^{-3} 氫氧化鈉溶液滴定，達終點時用去 22.4 cm^3 。計算原白醋中醋酸的濃度，以 $\text{g}/100\text{ cm}^3$ 表示 (CH_3COOH 相對分子質量 60，取兩位小數)。(3 分)

(b) 此滴定應選用酚酞而不是甲基橙，解釋原因。(2 分)

(c) 指出一個可能令結果偏高的實驗誤差，並說明原因。(2 分)

答案：(a) NaOH 摩爾數 $= 0.100 \times 0.0224 = 0.00224\text{ mol}$ *1；原醋 25.0 cm^3 含醋酸 $0.00224 \times 10 = 0.02240\text{ mol}$ ，即 1.344 g *1；濃度 $= 1.344 \div 25.0 \times 100 = 5.38\text{ g}/100\text{ cm}^3$ *1

(b) 終點生成醋酸鈉，溶液呈弱鹼性 *1；酚酞變色範圍 $8.3 - 10.0$ 與之相符，甲基橙在酸性範圍變色，會提早變色 *1

(c) 滴定管未用 NaOH 溶液沖洗（殘留蒸餾水），令 NaOH 濃度下降 *1；耗用體積因而偏大，計算所得醋酸濃度偏高 *1

8. (a) 以比色法測定某有色離子溶液：濃度 $2.0 \times 10^{-4}\text{ mol dm}^{-3}$ 的標準液吸光度為 0.45，同一比色皿中未知液的吸光度為 0.72。計算未知液的濃度。(3 分)

(b) 薄層色譜中，溶劑前沿移動 6.0 cm ，樣本的兩個斑點分別移動 3.6 cm 及 2.4 cm 。計算兩個斑點的 R_f 值。(2 分)

(c) 解釋為何點樣本時不可把斑點浸在展開溶劑液面之下。(2 分)

答案：(a) 同一比色皿下吸光度與濃度成正比 *1； $c = 2.0 \times 10^{-4} \times 0.72 \div 0.45$ *1； $= 3.2 \times 10^{-4}\text{ mol dm}^{-3}$ *1

(b) $R_f = \text{斑點移動距離} \div \text{溶劑前沿距離}$ *1；分別為 0.60 及 0.40 *1

(c) 樣本會直接溶入展開溶劑中 *1；斑點隨溶劑在起點附近被帶走，無法分離及計算 R_f *1

9. (a) 某有機化合物的質譜圖在 $m/z = 58$ 有分子離子峰，並在 $m/z = 43$ 有強碎片峰；它的紅外光譜在 1710 cm^{-1} 有強吸收，但在 $2500 - 3300\text{ cm}^{-1}$ 無寬吸收。指出該化合物是丙烷、丙醛還是丙酸，並解釋。(2 分)

(b) 另一化合物在 1710 cm^{-1} 及 $2500 - 3300\text{ cm}^{-1}$ 均有吸收，其相對分子質量為 88。寫出它的結構式。(2 分)

(c) 稱取 0.1000 g 某一元羧酸（相對分子質量 88）溶於水，需用 11.36 cm^3 的 0.100 mol dm^{-3} 氫氧化鈉溶液中和。由實驗數據計算該酸的相對分子質量。(2 分)

答案：(a) 丙醛 *1； $m/z = 58$ 與丙醛 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) 相符， 1710 cm^{-1} 為 $\text{C}=\text{O}$ 伸縮振動，而無寬吸收表示沒有 $\text{O}-\text{H}$ ，故不是丙酸；丙烷則無 $\text{C}=\text{O}$ 吸收 *1

(b) 丁酸 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ *1； 1710 cm^{-1} 為 $\text{C}=\text{O}$ 、 $2500 - 3300\text{ cm}^{-1}$ 為羧酸 $\text{O}-\text{H}$ ， $M = 88$ 相符 *1

(c) NaOH 摩爾數 $= 0.100 \times 0.01136 = 0.00114\text{ mol}$ *1；一元酸故酸的摩爾數相同， $M = 0.1000 \div 0.00114 = 88.0$ *1