

HKDSE 化學 Paper 1B 結構題模擬卷

中四至中六 (HKDSE) 化學 | 時限：150 分鐘 | 總分：100 分 | 共 10 題

甲部 (50 分) — 第 1 至 5 題

結構題：須寫出完整步驟、代入過程及單位；化學方程式須配平並標示狀態符號。

1. (a) 將 25.0 g 碳酸鈣 (CaCO_3 ， $M_r = 100.1$) 放入坩堝強熱至完全分解。寫出配平的反應式 (連狀態符號)，並求生成氧化鈣的摩爾數。

(b) 求生成的氧化鈣質量，以及在標準室溫常壓 (摩爾體積 $24.0 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$) 下釋出的二氧化碳體積。

(c) 若實驗實際只得到 12.0 g 氧化鈣，求百分產率，並提出一個令產率偏低的原因。

答案：(a) $\text{CaCO}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g})$ 。 $n(\text{CaCO}_3) = 25.0 \div 100.1 = 0.2498 \text{ mol}$ ，故 $n(\text{CaO}) = 0.2498 \text{ mol}$ 。

[2 分：方程式 1、摩爾數 1]

(b) $m(\text{CaO}) = 0.2498 \times 56.1 = 14.01 \text{ g}$ ； $V(\text{CO}_2) = 0.2498 \times 24.0 = 5.99 \text{ dm}^3$ 。 [3 分]

(c) 百分產率 = $12.0 \div 14.01 \times 100\% = 85.6\%$ 。原因：加熱不足令部分 CaCO_3 未分解 / 粉末轉移時散失 / 坩堝未加蓋令部分 CaO 隨氣流逸出。 [3 分]

2. (a) 25.0 cm^3 未知濃度的氫氧化鈉溶液以 0.0500 M 硫酸滴定，達終點時用去 20.0 cm^3 。寫出配平離子方程式，並求 NaOH 的摩爾數。

(b) 求該氫氧化鈉溶液的濃度 (mol dm^{-3})。

(c) 若該批溶液共 250.0 cm^3 ，求其中 NaOH 的質量；並求改用 0.100 M 鹽酸滴定 25.0 cm^3 該溶液時所需的體積。

答案：(a) $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ (或 $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$)。 $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.0500 \times 0.0200 = 1.00\text{e-}03 \text{ mol}$ ， $n(\text{NaOH}) = 2 \times 1.00\text{e-}03 = 2.00\text{e-}03 \text{ mol}$ 。 [3 分]

(b) $c(\text{NaOH}) = 2.00\text{e-}03 \div 0.0250 = 0.0800 \text{ mol dm}^{-3}$ 。 [3 分]

(c) $m(\text{NaOH}) = 0.0800 \times 0.2500 \times 40.0 = 0.800 \text{ g}$ ； $V(\text{HCl}) = 2.00\text{e-}03 \div 0.100 = 0.0200 \text{ dm}^3 = 20.0 \text{ cm}^3$ 。 [4 分]

3. (a) 0.0600 g 鎂條加入過量稀鹽酸，40 秒內收集到 56.0 cm^3 氫氣 (標準室溫常壓，摩爾體積 $24.0 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$)。寫出配平方程式，並求鎂的摩爾數。

(b) 求理論上可得的氫氣體積 (cm^3) 及百分產率。

(c) 求這 40 秒內氫氣的平均生成速率 ($\text{cm}^3 \text{ s}^{-1}$)，並解釋為何反應後期速率下降。

答案：(a) $\text{Mg}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{MgCl}_2 (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})$ 。 $n(\text{Mg}) = 0.0600 \div 24.3 = 2.4691\text{e-}03 \text{ mol}$ 。 [3 分]

(b) $n(\text{H}_2) = 2.4691\text{e-}03 \text{ mol}$ ； $V = 2.4691\text{e-}03 \times 24.0 \times 1000 = 59.3 \text{ cm}^3$ ；百分產率 = $56.0 \div 59.3 \times 100\% = 94.5\%$ 。 [4 分]

(c) 平均速率 = $56.0 \div 40.0 = 1.40 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ 。後期鹽酸濃度下降、鎂的表面積減少 (被 MgCl_2 覆蓋)，有效碰撞頻率下降，故速率減慢。 [3 分]

4. 求下列各溶液的 pH (假設完全電離, 25 ° C) :

(a) 0.0100 M 鹽酸 ;

(b) 0.0100 M 氫氧化鈉 ;

(c) 0.00500 M 硫酸 ;

(d) 把 (a) 稀釋 1,000 倍後的溶液 ;

(e) 把 25.0 cm³ 的 (a) 與 25.0 cm³ 的 (b) 混合後的溶液。

答案 : (a) $[H^+] = 0.0100 \text{ M}$, $\text{pH} = 2.00$ 。 [2 分]

(b) $[OH^-] = 0.0100 \text{ M}$, $\text{pOH} = 2.00$, $\text{pH} = 12.00$ 。 [2 分]

(c) 硫酸為二元強酸, $[H^+] = 2 \times 0.00500 = 0.0100 \text{ M}$, $\text{pH} = 2.00$ 。 [2 分]

(d) $[H^+] = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$, $\text{pH} = 5.00$ 。 [2 分]

(e) 酸與鹼的摩爾數相等 (各 $2.50 \times 10^{-4} \text{ mol}$) , 完全中和, $\text{pH} = 7.00$ 。 [2 分]

5. 以酒精燈加熱盛有 200 g 水的鋁杯, 燃燒 0.200 g 乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $M_r = 46.0$) , 水溫上升 6.0 ° C。水的比熱容量為 $4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

(a) 求水吸收的熱能 (J 及 kJ) 。

(b) 求乙醇的燃燒焓變 ΔH (kJ mol^{-1}) 。

(c) 文獻值為 $-1,366 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求實驗值佔文獻值的百分比, 解釋差異, 並提出兩項改善方法。

答案 : (a) $q = mc\Delta T = 200 \times 4.18 \times 6.0 = 5016 \text{ J} = 5.02 \text{ kJ}$ 。 [4 分]

(b) $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0.200 \div 46.0 = 4.3478\text{e-}03 \text{ mol}$; $\Delta H = -5.02 \div 4.3478\text{e-}03 = -1154 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。 [4 分]

(c) 百分比 = $1154 \div 1,366 \times 100\% = 84.5\%$ 。差異源於熱能散失到空氣及鋁杯、乙醇未完全燃燒、部分熱用於加熱容器; 改善: 加擋風罩、用隔熱量熱計、確保乙醇完全燃燒並減慢加熱速度。 [4 分]

乙部 (50 分) — 第 6 至 10 題

結構題: 須寫出完整步驟、代入過程及單位; 化學方程式須配平並標示狀態符號。

6. 在 2.00 dm³ 容器中, 於 450 ° C 把 0.500 mol 氫氣與 0.500 mol 碘蒸氣混合。反應 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 達平衡時, 容器內餘下 0.200 mol 氫氣。

(a) 求平衡時各物質的濃度。

(b) 計算 450 ° C 下的平衡常數 K_c 。

(c) 求氫氣的轉化率, 並解釋把容器壓縮至 1.00 dm³ 對 HI 平衡濃度的影響。

答案 : (a) $[\text{H}_2]_0 = 0.500 \div 2.00 = 0.250 \text{ M}$, $[\text{H}_2]_{\text{eq}} = 0.200 \div 2.00 = 0.100 \text{ M}$; 變化 -0.150 M , 故 $[\text{I}_2]_{\text{eq}} = 0.100 \text{ M}$ 、 $[\text{HI}]_{\text{eq}} = 0.300 \text{ M}$ 。 [3 分]

(b) $K_c = [\text{HI}]^2 \div ([\text{H}_2][\text{I}_2]) = 0.300^2 \div (0.100 \times 0.100) = 9.00$ 。 [4 分]

(c) 轉化率 = $(0.250 - 0.100) \div 0.250 \times 100\% = 60.0\%$ 。壓縮至 1.00 dm³ 後各濃度加倍, 但反應前後氣體摩爾數相同 ($\Delta n = 0$) , K_c 不變、平衡位置不移動, HI 的平衡濃度變為原來的兩倍 (約 0.6 M) 。 [3 分]

7. 以 2.00 A 的電流電解硫酸銅(II) 溶液 30.0 分鐘 (法拉第常數 = $96,500 \text{ C mol}^{-1}$) 。

(a) 求通過的電量及電子的摩爾數。

(b) 求陰極析出銅的質量 ($\text{Ar}(\text{Cu}) = 63.5$) 。

(c) 求陽極生成氧氣的摩爾數及標準室溫常壓下的體積，並解釋電解期間溶液 pH 的變化。

答案：(a) $Q = 2.00 \times 1,800 = 3600 \text{ C}$; $n(e^-) = 3600 \div 96,500 = 3.7306\text{e-}02 \text{ mol}$ 。 [3 分]

(b) $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$, $n(\text{Cu}) = 3.7306\text{e-}02 \div 2 = 1.8653\text{e-}02 \text{ mol}$, $m = 1.8653\text{e-}02 \times 63.5 = 1.18 \text{ g}$ 。 [3 分]

(c) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^-$, $n(\text{O}_2) = 3.7306\text{e-}02 \div 4 = 9.3264\text{e-}03 \text{ mol}$, $V = 9.3264\text{e-}03 \times 24.0 \times 1000 = 224 \text{ cm}^3$ 。陽極不斷產生 H^+ , 而 Cu^{2+} 在陰極被消耗, 故 pH 下降 (藍色亦逐漸變淡) 。 [4 分]

8. (a) 某化合物含碳 40.0%、氫 6.70%、氧 53.3% (質量百分比) , 相對分子質量為 180。求其實驗式與分子式。

(b) 把 0.100 mol 乙醇與過量乙酸加熱迴流, 得 6.60 g 酯。寫出反應式、命名產物, 並求百分產率 ($\text{Mr}(\text{酯}) = 88.0$) 。

答案：(a) 摩爾比 $\text{C}:\text{H}:\text{O} = 40.0/12.0 : 6.70/1.0 : 53.3/16.0 = 3.33 : 6.70 : 3.33 = 1 : 2 : 1$, 實驗式 CH_2O ($\text{Mr} = 30.0$) 。分子式單位數 $= 180 \div 30.0 = 6$, 故分子式為 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 。 [5 分]

(b) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$, 產物為乙酸乙酯。理論質量 $= 0.100 \times 88.0 = 8.80 \text{ g}$, 百分產率 $= 6.60 \div 8.80 \times 100\% = 75.0\%$ 。 [5 分]

9. 以酸化高錳酸鉀溶液滴定 25.0 cm^3 鐵(II) 溶液, 達終點時用去 20.0 cm^3 0.0200 M KMnO_4 。

(a) 指出錳在 MnO_4^- 及 Mn^{2+} 中的氧化數, 並說明每粒 MnO_4^- 所得的電子數。

(b) 求 Fe^{2+} 的摩爾數。

(c) 求該鐵(II) 溶液的濃度, 以及 250.0 cm^3 該溶液含鐵的質量 ($\text{Ar}(\text{Fe}) = 55.8$) 。

答案：(a) MnO_4^- 中 Mn 的氧化數為 +7, Mn^{2+} 為 +2, 故每粒 MnO_4^- 得 5 個電子 (被還原) 。 [2 分]

(b) $n(\text{MnO}_4^-) = 0.0200 \times 0.0200 = 4.00\text{e-}04 \text{ mol}$; $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$, $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 4.00\text{e-}04 = 2.00\text{e-}03 \text{ mol}$ 。 [3 分]

(c) $c(\text{Fe}^{2+}) = 2.00\text{e-}03 \div 0.0250 = 0.0800 \text{ mol dm}^{-3}$; $m(\text{Fe}) = 0.0800 \times 0.2500 \times 55.8 = 1.116 \text{ g}$ 。 [5 分]

10. 在標準室溫常壓下, 3.20 g 某含碳、氫、氧的氣態化合物佔 2.40 dm^3 (摩爾體積 $24.0 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$) 。元素分析顯示其質量百分比為 C 37.5%、H 12.5%、O 50.0%。

(a) 求該氣體的摩爾數及相對分子質量。

(b) 求其實驗式及分子式。

(c) 畫出一個可能的結構式, 並解釋它與水完全互溶的原因。

答案：(a) $n = 2.40 \div 24.0 = 0.100 \text{ mol}$; $\text{Mr} = 3.20 \div 0.100 = 32.0$ 。 [3 分]

(b) 摩爾比 $= 37.5/12.0 : 12.5/1.0 : 50.0/16.0 = 3.125 : 12.5 : 3.125 = 1 : 4 : 1$, 實驗式 CH_4O ($\text{Mr} = 32.0$) , 與 Mr 32.0 相同, 故分子式亦為 CH_4O 。 [4 分]

(c) 結構式 CH_3-OH (甲醇) ; $-\text{OH}$ 基可與水分子形成氫鍵, 故與水完全互溶。 [3 分]