

HKDSE 數學延伸部分單元一

中四至中六 (HKDSE) 數學 (延伸單元一) | 時限：150 分鐘 | 總分：100 分 | 共 8 題

甲部：二項式、指數與對數、求導與積分 (50 分)

結構題：須寫出完整步驟、代入過程及單位；概率答案須先寫分佈及參數。全卷 8 題，共 100 分，時限 2 小時 30 分，可使用計算機。

1. (a) 將 $(1 + 2x)^7$ 展開至 x^3 項 (即列出常數項至 x^3 的係數)。

(b) 求 $(1 - 3x)^9$ 展開式中 x^4 的係數。

答案：答案：(a) 由二項式定理，係數為 $C(7,k) \cdot 2^k$ ： $x^0 = 1$ 、 $x^1 = 14$ 、 $x^2 = 84$ 、 $x^3 = 280$ ，故 $(1 + 2x)^7 = 1 + 14x + 84x^2 + 280x^3 + \dots$ 。(b) 一般項為 $C(9,r)(-3x)^r$ ，取 $r=4$ ： $C(9,4) \times (-3)^4 = 126 \times 81 = 10206$ 。(評分要點：須寫出二項式一般項；只寫答案而無展開步驟最多得一半分)

2. (a) 解方程 $2^{x+1} = 5^{2x}$ ，答案準確至 3 位有效數字。

(b) 解方程 $\log_2 x + \log_2 (x - 3) = 2$ ，並說明為何要捨去其中一個根。

答案：答案：(a) 兩邊取自然對數： $(x + 1)\ln 2 = 2x \cdot \ln 5$ ，整理得 $x(2\ln 5 - \ln 2) = \ln 2$ ，故 $x = \ln 2 \div (2\ln 5 - \ln 2) = 0.2744 \approx 0.274$ 。(b) 合併對數： $\log_2 [x(x - 3)] = 2$ ，即 $x^2 - 3x = 4$ ， $x^2 - 3x - 4 = 0$ ， $(x - 4)(x + 1) = 0$ ，得 $x = 4$ 或 $x = -1$ ；因對數要求 $x > 3$ ，故捨去 $x = -1$ ，答案 $x = 4$ 。(評分要點：漏寫定義域檢查扣 2 分)

3. 設 $y = x^2 e^{3x}$ 。

(a) 求 dy/dx ，並以乘積法則及連鎖法則說明步驟。

(b) 求曲線在 $x = 1$ 處的切線方程，答案以 e 表示。

答案：答案：(a) 設 $u = x^2$ 、 $v = e^{3x}$ ， $u' = 2x$ 、 $v' = 3e^{3x}$ ； $dy/dx = 2x \cdot e^{3x} + x^2 \cdot 3e^{3x} = e^{3x}(2x + 3x^2)$ 。(b) $x = 1$ 時 $y = e^3$ ，斜率 $= e^3(2 + 3) = 5e^3 = 100.4$ ；切線： $y - e^3 = 5e^3(x - 1)$ ，即 $y = 5e^3x - 4e^3$ (y 截距 $-4e^3 = 20.1$)。(評分要點：漏乘 v' 只得一半分；切線須用點斜式並化簡)

4. 曲線 $y = x^2 - x - 2$ 與 x 軸相交於 A 、 B 兩點。

(a) 求 A 、 B 的坐標。

(b) 求曲線與 x 軸所圍成的區域面積，答案以分數表示。

答案：答案：(a) 令 $x^2 - x - 2 = 0$ ， $(x - 2)(x + 1) = 0$ ，故 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 0)$ 。(b) 面積 $= |\int_{-1 \rightarrow 2} (x^2 - x - 2)dx|$ ，原函數為 $x^3/3 - x^2/2 - 2x$ ；代入 2 得 -3.3333 ，代入 -1 得 1.1667 ，面積 $= |-3.3333 - (1.1667)| = 4.5000 = 9/2$ 平方單位。(評分要點：須寫出原函數及上下限；漏絕對值而負數作答扣 2 分)

乙部：數值積分、離散與連續概率分佈（50 分）

結構題：須寫出完整步驟、代入過程及單位；概率答案須先寫分佈及參數。全卷 8 題，共 100 分，時限 2 小時 30 分，可使用計算機。

5. 下表為函數 $f(x)$ 在五個點的取值： $x = 0、0.5、1.0、1.5、2.0$ 時， $f(x)$ 分別為 1.000、1.284、1.649、2.117、2.718。

(a) 用梯形法則（5 個測點、4 個小區間）估算 $\int_0^2 f(x)dx$ ，答案準確至 3 位小數。

(b) 說明若把區間數目加倍，估算值一般會如何改變，並指出梯形法則的誤差方向。

答案：答案：(a) 步長 $h = 0.5$ ，梯形法則： $h/2 \times [f_0 + f_4 + 2(f_1 + f_2 + f_3)]$ ， $= 0.25 \times [1.000 + 2.718 + 2 \times (1.284 + 1.649 + 2.117)] = 0.25 \times 13.818 = 3.4545 \approx 3.454$ 。(b) 區間數目加倍（ h 減半）時，梯形法則為二階方法，誤差約按 $1/4$ 縮小，估算值會趨近真值；對上凸或下凹曲線其誤差有固定方向（凸向下時偏低、凸向上時偏高），故不能一概而論。（評分要點：須寫出加權 2 的中間項；只寫公式未代數值扣 2 分）

6. 設隨機變數 X 服從二項分佈 $B(20, 0.3)$ 。

(a) 求 $P(X = 6)$ ，答案準確至 4 位小數。

(b) 求 $P(X \geq 2)$ ，並寫出 $E(X)$ 及 $\text{Var}(X)$ 。

答案：答案：(a) $P(X = 6) = C(20, 6)(0.3)^6 (0.7)^{14} = 38760 \times 0.000729 \times 0.0067822 \approx 0.1916$ 。(b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.0007979 - 0.0068393 \approx 0.9924$ ； $E(X) = np = 20 \times 0.3 = 6$ ， $\text{Var}(X) = np(1 - p) = 6 \times 0.7 = 4.2$ 。（評分要點：須寫出二項分佈公式；用 $1 - P(X \leq 1)$ 時須列兩項）

7. 設某十字路口的車輛到達數目服從泊松分佈，平均每 30 秒有 4 輛車到達，記 X 為 30 秒內的到達數目。

(a) 求 $P(X = 3)$ ，答案準確至 4 位小數。

(b) 求 $P(X \leq 1)$ ，並求 15 秒內沒有車輛到達的概率。

答案：答案：(a) $X \sim \text{Po}(4)$ ， $P(X = 3) = e^{-4} \times 4^3 \div 3! = 0.0183156 \times 64 \div 6 \approx 0.1954$ 。(b) $P(X \leq 1) = e^{-4} (1 + 4) \approx 0.0916$ ；15 秒內平均 2 輛，故 $P(\text{無車}) = e^{-2} = 0.1353$ 。（評分要點：泊松公式須寫出 λ ；15 秒一段須先把 λ 換成 2，直接沿用 4 扣 3 分）

8. 設某考試成績 X 服從正態分佈，平均值 50 分、標準差 10 分。

(a) 求 $P(X > 62)$ 及 $P(45 < X < 65)$ ，各準確至 4 位小數。

(b) 若只有最高 10% 考生獲甲級，求甲級的最低分數 k （準確至 1 位小數），並解釋所用的標準分。

答案：答案：(a) 標準化 $z = (x - 50)/10$ ； $P(X > 62) = P(Z > 1.2) \approx 0.1151$ ； $P(45 < X < 65) = P(-0.5 < Z < 1.5) \approx 0.6247$ 。(b) 需 $P(Z < z_0) = 0.9$ ，查表 $z_0 \approx 1.2816$ ，故 $k = 50 + 1.2816 \times 10 = 62.8$ 分。（評分要點：須寫出標準化步驟；直接用原值查表不給分）