

IB 化學 SL Paper 2 結構題模擬卷 | 6 題 · 50 分 · 1 小時 15 分

中五至中六 (IB SL) 化學 | 時限：75 分鐘 | 總分：50 分 | 共 6 題

甲部：數據題 (30 分)

結構題：須列出計算步驟，答案須附正確單位；每題所有小題均須作答。全卷 50 分。

- 在 25°C 下，把大理石碎塊（碳酸鈣）加入 50.0 cm^3 1.00 mol dm^{-3} 鹽酸，量度放出的二氧化碳體積。時間/s：0、20、40、60、80、100；體積/ cm^3 ：0、24、40、50、54、55。
(a) 計算最初 20 s 的平均反應速率 ($\text{cm}^3\text{ s}^{-1}$)。(2 分)
(b) 計算第 40 s 至第 60 s 的平均反應速率。(1 分)
(c) 解釋反應速率隨時間下降的原因。(3 分)
(d) 說明如何由數據求初始速率，並指出一項可令初始速率上升的改變及其原因。(2 分)
- 25.0 cm^3 未知濃度的乙酸溶液以 0.100 mol dm^{-3} 氫氧化鈉溶液滴定，以酚酞作指示劑，三次滴定平均用去 23.60 cm^3 。
(a) 計算乙酸溶液的濃度 (mol dm^{-3})。(3 分)
(b) 計算 250.0 cm^3 該乙酸溶液所含乙酸的質量 (g； $M_r = 60.05$)。(3 分)
(c) 解釋為何選用酚酞而不用甲基橙作指示劑。(2 分)
- 在簡易量熱計中燃燒 1.15 g 乙醇，用以加熱 150 g 水，水溫由 21.3°C 升至 43.7°C 。（水的比熱容量 = $4.18\text{ J g}^{-1}\text{ K}^{-1}$ ；乙醇 $M_r = 46.07$ ；文獻 $\Delta H_c = -1367\text{ kJ mol}^{-1}$ ）
(a) 計算水吸收的熱能 (kJ)。(2 分)
(b) 計算乙醇的實驗摩爾燃燒焓 (kJ mol^{-1})。(3 分)
(c) 計算實驗值佔文獻值的百分比，並提出兩個令實驗值偏低的理由。(2 分)
- 在 25°C 下， 0.100 mol dm^{-3} 乙酸的 $K_a = 1.74 \times 10^{-5}$ 。
(a) 寫出 K_a 的表達式。(1 分)
(b) 計算平衡時氫離子濃度 (mol dm^{-3})。(2 分)
(c) 計算該溶液的 pH。(1 分)
(d) 計算乙酸的電離度 (%)。(1 分)
(e) 加入少量乙酸鈉固體後，說明 pH 與電離度如何改變並解釋。(2 分)

乙部：延伸題 (20 分)

結構題：須列出計算步驟，答案須附正確單位；每題所有小題均須作答。全卷 50 分。

- 以 2.50 A 的穩定電流電解硫酸銅(II)溶液 30.0 分鐘，用銅作陰極。（法拉第常數 = $96\,485\text{ C mol}^{-1}$ ；Cu 的相對原子質量 = 63.55）
(a) 計算通過的電荷 (C)。(2 分)
(b) 計算電子的摩爾數。(1 分)
(c) 計算陰極析出銅的質量 (g)。(3 分)
(d) 寫出陽極的反應式，並解釋溶液藍色逐漸變淡的原因。(2 分)
(e) 若電流效率只有 92%，實際析出的銅質量是多少？(2 分)
- 12.0 g 乙酸與過量乙醇在濃硫酸催化下加熱，得 14.5 g 乙酸乙酯。（ M_r ：乙酸 60.05；乙醇 46.07；乙酸乙酯 88.11）
(a) 計算乙酸的摩爾數。(1 分)
(b) 計算乙酸乙酯的理論產量 (g)。(2 分)
(c) 計算百分產率 (%)。(2 分)
(d) 計算此反應的原子經濟性 (%)。(2 分)
(e) 提出三項可提高乙酸乙酯產量的方法，並簡述理由。(3 分)